Критерий сходимости интеграла Меллина-Барнса для решения системы
алгебраических уравнений
В.Р. Куликов

Аннотация

В работе получен критерий сходимости интеграла Меллина-Барнса, представляющего решение общей системы алгебраических уравнений. Как следствие, приводится критерий того, что все главные миноры неотрицательной матрицы положительны. В основе доказательства результатов лежит теорема Нильсон-Пассаре-Циха об области сходимости общего интеграла Меллина-Барнса, а также известная теорема из линейной алгебры о разбиении вещественного пространства на многогранные углы.

Ключевые слова: алгебраические уравнения, интеграл Меллина-Барнса, гипергеометрическая функция, области сходимости интегралов.

Abstract

In the paper we obtain the criterion for the convergence of a Mellin-Barnes integral representing a solution to a general system of algebraic equations. This result yields also a criterion to principal minors of a matrix with nonnegative elements to be positive. The proof is based on the theorem on domains of convergence of Mellin-Barnes integrals by Nilsson-Passare-Tsikh and the well-known theorem of linear algebra on a decomposition of real space into polyhedral cones.

Keywords: algebraic equations, Mellin-Barnes integral, hypergeometric functions, domains of convergence of integrals.

Введение

Х. Меллин в 1921 году привел интеграл Меллина-Барнса [1], представляющий решение $y(x)$ приведенного алгебраического уравнения вида

$$y^n + x_1 y^{n-1} + \dots + x_{n-1} y - 1 = 0.$$

Этот интеграл имеет непустую область сходимости, она определяется условиями на аргументы $\theta_j = \arg x_j$. Полное описание области сходимости такого интеграла было получено сравнительно недавно в статье И.А. Антиповой [2, 3]. Кроме того в работах [4, 5] рассматриваются системы дифференциальных уравнений (системы Меллина), которым удовлетворяют решения алгебраического уравнения.

В настоящей работе речь идет об аналогичных исследованиях в многомерной ситуации. Рассмотрим систему алгебраических уравнений вида

$$y_j^{m_j} + \sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} x_\lambda^{(j)} y^\lambda - 1 = 0, \quad j = 1, \dots, n, \quad (1)$$

где $\Lambda^{(j)} \subset \mathbb{Z}^n$. Также введем обозначение

$$\Lambda := \bigsqcup_{j=1}^n \Lambda^{(j)}$$

для дизъюнктивной суммы множеств $\Lambda^{(j)}$. Мощность множества Λ обозначим N . Множество коэффициентов системы (1) пробегает векторное пространство $\mathbb{C}^\Lambda \cong \mathbb{C}_x^N$, в котором координаты точек $x = (x_\lambda)$ индексируются элементами $\lambda \in \Lambda$. Группу координат, соответствующую индексам $\lambda \in \Lambda^{(i)}$, мы, как правило, выделяем записью $x_\lambda^{(i)}$, при этом отождествляя $\mathbb{C}^\Lambda$ с декартовым произведением $\mathbb{C}^{\Lambda^{(1)}} \times \dots \times \mathbb{C}^{\Lambda^{(n)}}$; иногда для элементов из $\mathbb{C}^{\Lambda^{(i)}}$ мы используем обозначение x_λ с обязательным подчеркиванием, что $\lambda \in \Lambda^{(i)}$.

Множество Λ также будем трактовать как матрицу

$$\Lambda = (\Lambda^{(1)}, \dots, \Lambda^{(n)}) = (\lambda^1, \dots, \lambda^N),$$

столбцами которой являются векторы $\lambda^k = (\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$ из показателей мономов системы (1). Здесь имеется ввиду, что блок $\Lambda^{(i)}$ матрицы Λ соответствует i -му уравнению системы (1), а нумерация столбцов λ^k внутри каждого из блоков $\Lambda^{(i)}$ произвольная, но фиксированная. Строки матрицы Λ мы обозначим φ_j , $j = 1, \dots, n$. Нас будет интересовать ветвь решения $y(x) = (y_1(x), \dots, y_n(x))$ системы (1) с условием $y(0) = (1, \dots, 1)$, которую назовем *главным решением*. Следуя работам [6, 7], моному $y^\mu = y_1^{\mu_1} \dots y_n^{\mu_n}$ главного решения $y = y(x)$ данной системы поставим в соответствие интеграл Меллина-Барнса:

$$\frac{1}{(2\pi i)^N} \int_{\gamma + i\mathbb{R}^N} \frac{\prod_{j=1}^n \prod_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} \Gamma(u_\lambda^{(j)}) \prod_{j=1}^n \Gamma\left(\frac{\mu_j}{m_j} - \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, u \rangle\right)}{\prod_{j=1}^n \Gamma\left(\frac{\mu_j}{m_j} - \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, u \rangle + \sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} u_\lambda^{(j)} + 1\right)} Q(u) x^{-u} du, \quad (2)$$

где вектор γ выбирается из многогранника

$$\{u \in \mathbb{R}_{>0}^N : \langle \varphi_j, u \rangle < \mu_j, j = 1, \dots, n\},$$

а $Q(u)$ — многочлен выражаемый определителем

$$(3) Q(u) = \frac{1}{m_1 \dots m_n} \det \left\| \delta_i^j (\mu_j - \langle \varphi_j, u \rangle) + \langle \varphi_j^{(i)}, u^{(i)} \rangle \right\|_{i,j=1}^n.$$

Интеграл (2) получается формальным вычислением преобразования Меллина для $y^\mu(x)$ с помощью замены переменных, линеаризующей систему (1) ([6, 7]).

Рассмотрим совокупность всех матриц вида

$$\begin{pmatrix} \lambda_1^{(1)} & \dots & \lambda_1^{(n)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_n^{(1)} & \dots & \lambda_n^{(n)} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

где каждый вектор-столбец $\lambda^{(j)} = (\lambda_1^{(j)} \dots \lambda_n^{(j)})^T$ пробегает соответствующее множество $\Lambda^{(j)}$, т.е. множество показателей мономов с переменными коэффициентами, участвующих в j -м уравнении (1).

Будем называть минор матрицы *главным*, если совокупность номеров его выделенных строк совпадает с совокупностью номеров выделенных столбцов.

Теорема 1 Интеграл (2), соответствующий решению системы алгебраических уравнений (1), имеет непустую область сходимости тогда и только тогда, когда в каждой матрице вида (4) все главные миноры положительны. proclaim

Таким образом, видим, что класс систем, для которых интеграл (2) имеет непустую область сходимости весьма невелик.

В доказательстве сформулированной теоремы используется результат Л. Нильсон, М. Пассаре и А.К. Циха (см. [8] или раздел 4.4.1 в [9]) о множестве сходимости общего интеграла Меллина-Барнса. Кроме того важную роль в доказательстве играет теорема о разбиении пространства $\mathbb{R}^n$ на многогранные углы [10] (см. также [11, стр.134]).

Отметим, что в настоящей работе исследуется лишь вопрос о непустоте области сходимости интеграла (2). Вычисление самой области сходимости — трудоемкая задача. Поскольку сингулярные точки решения $y(x)$ системы (1) составляют дискриминантное множество системы (1) (см. [12]), описание областей сходимости тесно связано с понятием коамёбы дискриминантного множества (напомним, что коамёбой алгебраического множества называют его образ на угловое подпространство). В случае $n = 1$ взаимное расположение коамёб для области сходимости и дискриминантного множества иллюстрируется в работе [2] (см. также [9, п. 4.4]). Частный случай теоремы 1 для $n = 2$ был доказан в работе [13].

1 Необходимое условие сходимости интеграла (2)

Как видно из введения, сопоставленный моному решения интеграл (2) относится к классу интегралов Меллина-Барнса. Напомним, что под обычным кратным интегралом Меллина-Барнса понимается интеграл [14]

$$\Phi(z) = \frac{1}{(2\pi i)^m} \int_{\gamma + i\mathbb{R}^m} \frac{\prod_{j=1}^p \Gamma(\langle A_j, s \rangle + c_j)}{\prod_{k=1}^q \Gamma(\langle B_k, s \rangle + d_k)} z_1^{-s_1} \dots z_m^{-s_m} ds, \quad (5)$$

где $A_j, B_k \in \mathbb{R}^m$, $c_j, d_k \in \mathbb{C}$ и $ds = ds_1 \dots ds_m$. Вектор $\gamma \in \mathbb{R}^m$ должен выбираться таким образом, чтобы множество интегрирования $\gamma + i\mathbb{R}^m$ не содержало полюсов Γ -функций в числителе.

Мы будем предполагать, что переменное z изменяется в римановой области наложения над комплексным алгебраическим тором $\mathbb{T}^m = (\mathbb{C} \setminus 0)^m$,

а значит, множители ядра интеграла (2) определяются как

$$z_j^{-s_j} = e^{-s_j \log z_j}, \quad \arg z_j \in \mathbb{R}.$$

Обозначим $\theta = \text{Arg} z = (\arg z_1, \dots, \arg z_m)$ и введем функцию

$$g(v) := \sum_{j=1}^p |\langle A_j, v \rangle| - \sum_{k=1}^q |\langle B_k, v \rangle|. \quad (6)$$

Следующая теорема дает описание области сходимости кратного интеграла Меллина-Барнса. **Теорема 2.** (Нильсон, Пассаре, Цих [8]) Для любого множества интегрирования $\gamma + i\mathbb{R}^m$, не содержащего особенности подынтегрального выражения, область сходимости интеграла Меллина-Барнса (2) имеет вид $\text{Arg}^{-1}(U)$, где

$$U = \bigcap_{\|v\|=1} \{\theta \in \mathbb{R}^m : |\langle v, \theta \rangle| < \frac{\pi}{2} g(v)\}. \quad (7)$$

В случае, когда множество U непусто, оно совпадает с внутренностью Θ° многогранника

$$\Theta = \{\theta \in \mathbb{R}^m : |\langle v_\nu, \theta \rangle| \leq \frac{\pi}{2} g(v_\nu), \nu = 1, \dots, d\},$$

где $\pm v_1, \dots, \pm v_d$ — множество всех единичных векторов, порождающих верш K , определяемый разбиением пространства $\mathbb{R}^m$ гиперплоскостями $\langle A_j, v \rangle = 0$, $j = 1, \dots, p$ и $\langle B_k, v \rangle = 0$, $k = 1, \dots, q$.

Таким образом область сходимости интеграла (2) непуста, если функция $g(v)$ положительна на компакте (сфере) $\|v\| = 1$. В силу однородности функции $g(v)$ это равносильно свойству её положительности при $v \neq 0$.

В отличие от (5) интеграл (2) содержит полиномиальный множитель $Q(u)$ (см. (3)) поэтому сформулируем и докажем следующее утверждение.

Лемма. Область сходимости интеграла (2) не зависит от присутствия в нем полиномиального множителя $Q(u)$.

Доказательство. Заметим, что в определении (3) многочлена $Q(u)$ рассматривается определитель матрицы, равной сумме диагональной матрицы с элементами $(\mu_j - \langle \varphi_j, u \rangle)$ на диагонали и квадратной матрицы с элементами $\langle \varphi_j^{(i)}, u^{(i)} \rangle$. Поэтому указанный определитель является суммой выражений

$$C \prod_{k \notin I} (\mu_k - \langle \varphi_k, u \rangle) u_{\lambda^{(i_1)}}^{(i_1)} \dots u_{\lambda^{(i_q)}}^{(i_q)}$$

по всем мультииндексам $I = \{i_1, \dots, i_q\}$ мощности $q \in \{0, 1, \dots, n\}$ и всем $\lambda^{(i_j)} \in \Lambda^{(i_j)}$, $j = 1, \dots, q$, а величины C не зависят от переменной u . Тогда интеграл (2) можем записать как сумму интегралов вида

$$\begin{aligned}
& \frac{C}{(2\pi i)^N} \int_{\gamma + i\mathbb{R}^N} \frac{\prod_{j=1}^n \prod_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} \Gamma(u_\lambda^{(j)}) \prod_{j=1}^n \Gamma\left(\frac{\mu_j}{m_j} - \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, u \rangle\right)}{\prod_{j=1}^n \Gamma\left(\frac{\mu_j}{m_j} - \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, u \rangle + \sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} u_\lambda^{(j)} + 1\right)} \times \\
& \times \prod_{k \notin I} (\mu_k - \langle \varphi_k, u \rangle) u_{\lambda^{(i_1)}}^{(i_1)} \dots u_{\lambda^{(i_q)}}^{(i_q)} x^{-u} du. \tag{8}
\end{aligned}$$

В полученных интегралах воспользуемся равенством $z\Gamma(z) = \Gamma(z+1)$, согласно которому

$$\begin{aligned}
& \Gamma(u_{\lambda^{(i_j)}}^{(i_j)}) u_{\lambda^{(i_j)}}^{(i_j)} = \Gamma(u_{\lambda^{(i_j)}}^{(i_j)} + 1) \\
& \Gamma\left(\frac{\mu_k}{m_k} - \frac{1}{m_k} \langle \varphi_k, u \rangle\right) (\mu_k - \langle \varphi_k, u \rangle) = m_k \Gamma\left(\frac{\mu_k}{m_k} - \frac{1}{m_k} \langle \varphi_k, u \rangle + 1\right).
\end{aligned}$$

В результате интегралы (8) запишутся в виде (5), т.е. в виде интеграла, у которого подынтегральное выражение кроме ядра x^{-u} содержит только отношение произведений гамма-функций в композиции с аффинными функциями. При этом линейные части указанных функций, такие же как в (2). Но по теореме 1 область сходимости интеграла Меллина-Барнса зависит лишь от этих линейных частей (см. (6)). Таким образом, полином $Q(u)$ не влияет на область сходимости интеграла (2). $\square$

Для интеграла (2) функцию $g(v)$ можно записать в виде

$$g(v) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} |v_\lambda^{(j)}| + \left| \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, v \rangle \right| - \left| \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, v \rangle - \sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} v_\lambda^{(j)} \right| \right). \tag{9}$$

Определенный в теореме 2 веер K порождается N координатными гиперплоскостями

$$v_\lambda^{(j)} = 0, \lambda \in \Lambda^{(j)}, j = 1, \dots, n$$

и $2n$ гиперплоскостями

$$\begin{aligned}
& \langle \varphi_j, v \rangle = 0, j = 1, \dots, n, \\
& -\frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, v \rangle + \sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} v_\lambda^{(j)} = 0, j = 1, \dots, n.
\end{aligned}$$

Отметим, что множество векторов $\{\pm v_1, \dots, \pm v_d\}$, порождающих веер K , получаются как направляющие векторы прямых, образованных пересечениями всевозможных независимых поднаборов из $N-1$ гиперплоскостей из указанного перечня. Такие векторы можно получать как векторные произведения нормальных векторов для этих $N-1$ гиперплоскостей. Тогда скалярное произведение $\langle \varphi_j, v \rangle$ есть определитель матрицы, составленной из строки φ_j и $N-1$ вектор-строк, ортогональных вектору v .

Доказательство положительности всех главных миноров проведем методом математической индукции по порядку k этих миноров.

Заметим, что в состав векторов $\{\pm v_1, \dots, \pm v_d\}$, входят все базисные векторы $e_\lambda^{(i)}$, $\lambda \in \Lambda^{(i)}$, $i = 1, \dots, n$. По своему определению вектор φ_j имеет на месте с индексом $\lambda^{(i)}$ координату $\lambda_j^{(i)}$, поэтому

$$g(e_\lambda^{(i)}) = 1 + \sum_{j=1}^n \left| \frac{\lambda_j^{(i)}}{m_j} \right| - \sum_{j=1}^n \left| \frac{\lambda_j^{(i)}}{m_j} - \delta_j^i \right| = 1 + \left| \frac{\lambda_i^{(i)}}{m_i} \right| - \left| \frac{\lambda_i^{(i)}}{m_i} - 1 \right|.$$

По условию теоремы 1 многогранник Θ невырожден, поэтому имеем неравенство $g(e_\lambda^{(i)}) > 0$, из которого получаем, что $\frac{\lambda_i^{(i)}}{m_i}$ и 1 должны быть одного знака. Отсюда $\lambda_i^{(i)} > 0$ для любого $\lambda \in \Lambda^{(i)}$, что и доказывает положительность всех главных миноров порядка 1 матрицы (4), т.е. базу индукции.

Пусть теперь все главные миноры до k -го порядка матрицы (4) положительны. Рассмотрим направляющий вектор v для прямой, полученной пересечением $N - (k + 1)$ координатных гиперплоскостей и гиперплоскостей

$$\langle \varphi_{j_1}, u \rangle = 0, \dots, \langle \varphi_{j_k}, u \rangle = 0,$$

причем в набор координатных гиперплоскостей мы не включаем гиперплоскости с нормальными

$$e_{\lambda^{(j_1)}}^{(j_1)}, \dots, e_{\lambda^{(j_k)}}^{(j_k)}$$

и некоторую гиперплоскость с нормалью вида $e_{\lambda^{(s)}}^{(s)}$, $s \neq j_1, \dots, s \neq j_k$.

Заметим, что координаты $v_\lambda^{(j)} = \langle v, e_\lambda^{(j)} \rangle$ вектора v равны 0 для всех $e_\lambda^{(j)}$ кроме $e_{\lambda^{(j_1)}}^{(j_1)}, \dots, e_{\lambda^{(j_k)}}^{(j_k)}$ и $e_{\lambda^{(s)}}^{(s)}$. Кроме того скалярные произведения $\langle \varphi_j, v \rangle$ равны 0 для всех $j = j_1, \dots, j_k$. Поэтому в обозначениях $J = \{j_1, \dots, j_k\}$, и $\bar{J} = \{1, \dots, n\} \setminus (J \cup \{s\})$ получаем следующее выражение для $g(v)$:

$$\begin{aligned} g(v) = & \sum_{p \in J} \left| v_{\lambda^{(p)}}^{(p)} \right| + \left| v_{\lambda^{(s)}}^{(s)} \right| + \sum_{q \in \bar{J}} \left| \frac{1}{m_q} \langle \varphi_q, v \rangle \right| + \left| \frac{1}{m_s} \langle \varphi_s, v \rangle \right| - \\ & - \sum_{p \in J} \left| v_{\lambda^{(p)}}^{(p)} \right| - \left| v_{\lambda^{(s)}}^{(s)} - \frac{1}{m_s} \langle \varphi_s, v \rangle \right| - \sum_{q \in \bar{J}} \left| \frac{1}{m_q} \langle \varphi_q, v \rangle \right|. \end{aligned}$$

Приводя подобные слагаемые, получим

$$g(v) = \left| v_{\lambda^{(s)}}^{(s)} \right| + \left| \frac{1}{m_s} \langle \varphi_s, v \rangle \right| - \left| v_{\lambda^{(s)}}^{(s)} - \frac{1}{m_s} \langle \varphi_s, v \rangle \right|.$$

С учетом того, что вектор v есть обобщенное векторное произведение $N - 1$ векторов, его координаты представляют собой миноры $(N - 1)$ -го порядка матрицы, составленной из нормальных векторов для гиперплоскостей. А скалярное произведение $\langle \varphi_j, v \rangle$ можно записать как определитель

N -го порядка матрицы, составленной из строки φ_j и $N - 1$ вектор-строк ортогональных v . Таким образом, с учетом единиц на главной диагонали, получаем следующее выражение для $g(v)$

$$\begin{aligned} & \left| \det \begin{pmatrix} \lambda_{j_1}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_1}^{(j_k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{j_k}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_k}^{(j_k)} \end{pmatrix} \right| + \left| \det \begin{pmatrix} \lambda_{j_1}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_1}^{(j_k)} & \lambda_{j_1}^{(s)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{j_k}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_k}^{(j_k)} & \lambda_{j_k}^{(s)} \\ \lambda_s^{(j_1)} & \dots & \lambda_s^{(j_k)} & \lambda_s^{(s)} \end{pmatrix} \right| \\ & - \left| \det \begin{pmatrix} \lambda_{j_1}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_1}^{(j_k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{j_k}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_k}^{(j_k)} \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} \lambda_{j_1}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_1}^{(j_k)} & \lambda_{j_1}^{(s)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{j_k}^{(j_1)} & \dots & \lambda_{j_k}^{(j_k)} & \lambda_{j_k}^{(s)} \\ \lambda_s^{(j_1)} & \dots & \lambda_s^{(j_k)} & \lambda_s^{(s)} \end{pmatrix} \right|. \end{aligned}$$

Отсюда получаем, что для положительности $g(v)$ главный минор $(k + 1)$ -го порядка должен быть того же знака, что и главный минор k -го порядка. А главный минор k -го порядка положителен по предположению индукции.

Тем самым, необходимость условия в теореме 1 доказана.

2 Достаточное условие сходимости интеграла (2)

Пусть для системы (1) выполняется условие положительности главных миноров матриц (4). Рассмотрим функцию $g(v)$, определенную равенством (9). Из неравенства треугольника видно, что эта функция неотрицательна: $g(v) \geq 0$. Это означает, что в неравенствах, определяющих область сходимости (7), в правой части всегда стоит неотрицательное число. Таким образом область сходимости интеграла (2) непустая, если функция $g(v)$ не обращается в 0 на компакте $\|v\| = 1$. В силу однородности функции $g(v)$ это равносильно свойству её положительности при $v \neq 0$. Докажем это свойство.

Функция $g(v)$, определенная в (9) может обратиться в 0 только, если все слагаемые

$$\sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} \left| v_{\lambda}^{(j)} \right| + \left| \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, v \rangle \right| - \left| \frac{1}{m_j} \langle \varphi_j, v \rangle - \sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} v_{\lambda}^{(j)} \right|, j = 1, \dots, n$$

равны 0, а такое возможно только, если $(-\langle \varphi_j, v \rangle)$ и все $v_{\lambda}^{(j)}$ будут иметь один и тот же знак при каждом j . Таким образом, свойство $g(v) = 0$ равносильно совокупности систем следующего вида:

$$\begin{cases} \varepsilon_j v_{\lambda}^{(j)} \geq 0, & \lambda \in \Lambda^{(j)}, j = 1, \dots, n, \\ -\varepsilon_j \langle \varphi_j, v \rangle \geq 0, & j = 1, \dots, n, \end{cases} \quad (10)$$

где $\varepsilon_j = \pm 1$. Обозначим $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$.

Заметим, что первая группа неравенств в каждой системе определяет некоторый $N = |\Lambda|$ -мерный ортант R_ε в пространстве $\mathbb{R}^N$. Этот ортант можно представить как объединение n -мерных конусов, определяемых следующим образом.

Обозначим $\tau^{(j)} = (\{\tau_\lambda^{(j)}\}_{\lambda \in \Lambda^{(j)}})$ — вектор размерности $N_j = |\Lambda^{(j)}|$.

Рассмотрим семейство стандартных симплексов

$$\mathfrak{S}_j = \{\tau^{(j)} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{N_j} : \sum_{\lambda \in \Lambda^{(j)}} \tau_\lambda^{(j)} = 1\}.$$

Для каждой точки $\tau = (\tau^{(1)}, \dots, \tau^{(n)})$ из декартова произведения $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}_1 \times \dots \times \mathfrak{S}_n$ указанных симплексов и любого набора знаков $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ определим n -мерный конус

$$L_{\tau, \varepsilon} := \left\{ v \in \mathbb{R}^N \mid v = (v^{(1)}, \dots, v^{(n)}) = (\varepsilon_1 t_1 \tau^{(1)}, \dots, \varepsilon_n t_n \tau^{(n)}) : t \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n \right\}.$$

Нетрудно видеть, что $R_\varepsilon = \bigcup_{\tau \in \mathfrak{S}} L_{\tau, \varepsilon}$.

Сужение системы (10) на поверхность $L_{\tau, \varepsilon}$ записывается в виде

$$\begin{cases} t_j \geq 0, & j = 1, \dots, n, \\ -\varepsilon_j (\varepsilon_1 \langle \varphi_j^{(1)}, \tau^{(1)} \rangle t_1 + \dots + \varepsilon_n \langle \varphi_j^{(n)}, \tau^{(n)} \rangle t_n) \geq 0, & j = 1, \dots, n, \end{cases}$$

С помощью величин $a_j^k := \langle \varphi_j^{(k)}, \tau^{(k)} \rangle$ образуем матрицу $A := \|a_j^k\|_{j,k=1}^n$. В силу свойства полилинейности определителей и положительности векторов $\tau^{(j)}$, матрица A наследует свойство положительности главных миноров матриц (4). Таким образом получаем систему неравенств

$$\begin{cases} t_j \geq 0, & j = 1, \dots, n, \\ \varepsilon_j (-\varepsilon_1 a_j^1 t_1 - \dots - \varepsilon_n a_j^n t_n) \geq 0, & j = 1, \dots, n. \end{cases}$$

Так как матрица A невырожденная, то последние n неравенств определяют в пространстве $\mathbb{R}^n$ некоторый n -мерный конус K . Покажем, что пересечение этого конуса и ортанта $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$, определяемого первыми n неравенствами, состоит из одной точки 0. Конус K имеет вид:

$$K = \{t = -(D_\varepsilon A^{-1} D_\varepsilon)s : s \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n\},$$

где D_ε — диагональная матрица с элементами $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ на диагонали. Воспользуемся теоремой о разбиении $\mathbb{R}^n$ на многогранные углы [11, стр 134]

Пусть $e_1, \dots, e_n$ и $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ — два базиса, причем каждый набор векторов $\nu_1, \dots, \nu_n$, где $\nu_i = e_i$ или ϵ_i , является базисом. Каждый такой базис порождает конус

$$\{\lambda_1 \nu_1 + \dots + \lambda_n \nu_n, \lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n\}.$$

Очевидно, число таких конусов равно 2^n .

Теорема 3 (О разбиении $\mathbb{R}^n$ на многогранные углы [10, 11])

Пусть для определенности базис $e_1, \dots, e_n$ положительно ориентирован. Тогда рассматриваемые 2^n конусов покрывают $\mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда знак ориентации каждого из базисов $\nu_1, \dots, \nu_n$ равен $(-1)^s$, где s — количество векторов e_j в этом базисе.

Образующими ортанта $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$ являются базисные векторы $e_1, \dots, e_n$. Образующими конуса K являются строки матрицы $-D_\varepsilon(\|A_{ij}\|_1^n)^T D_\varepsilon$, где A_{ij} — алгебраическое дополнение элемента a_{ij} в матрице $A = \|a_{ij}\|_1^n$. Далее нам потребуется известное тождество Якоби [11, стр. 50], состоящее в следующем. Для любого натурального числа p из промежутка $1 \leq p < n$ и произвольной перестановки $\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_n \\ j_1 & \dots & j_n \end{pmatrix}$ справедливо равенство

$$\begin{vmatrix} A_{i_1 j_1} & \dots & A_{i_1 j_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{i_p j_1} & \dots & A_{i_p j_p} \end{vmatrix} = (-1)^\sigma |A|^{p-1} \begin{vmatrix} a_{i_{p+1} j_{p+1}} & \dots & a_{i_{p+1} j_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_n j_{p+1}} & \dots & a_{i_n j_n} \end{vmatrix}.$$

Отметим, что в силу тождества Якоби, транспонированная присоединенная матрица $\|A_{ij}\|_1^n^T$ сохраняет свойство положительности диагональных миноров. Оба этих набора векторов образуют базисы в пространстве $\mathbb{R}^n$. Покажем, что последовательное замещение векторов из первого набора на соответствующие векторы второго набора приводит к чередованию ориентации этих наборов векторов.

Пусть в базисе $e_1, \dots, e_n$ заменены векторы с номерами $J = \{j_1, \dots, j_p\}$, тогда матрица, образованная векторами полученного набора, имеет вид

$$(-(A^*)^T D_\varepsilon) E_J + (E - E_J),$$

где E_J — диагональная $n \times n$ -матрица, у которой диагональные элементы с номерами j_k равны 1, а остальные элементы равны 0. Определитель полученной матрицы равен

$$\begin{aligned} & \det[(-D_\varepsilon(A^*)^T D_\varepsilon) E_J + (E - E_J)] = \\ & = (-1)^p \begin{vmatrix} \varepsilon_{j_1} \varepsilon_{j_1} A_{j_1}^{j_1} & \dots & \varepsilon_{j_1} \varepsilon_{j_p} A_{j_1}^{j_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_{j_p} \varepsilon_{j_1} A_{j_p}^{j_1} & \dots & \varepsilon_{j_p} \varepsilon_{j_p} A_{j_p}^{j_p} \end{vmatrix} = (-1)^p \begin{vmatrix} A_{j_1}^{j_1} & \dots & A_{j_p}^{j_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{j_1}^{j_p} & \dots & A_{j_p}^{j_p} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Здесь минор присоединенной матрицы положителен в силу тождества Якоби, поэтому при замещении p векторов в наборе $e_1, \dots, e_n$ на соответствующие образующие конуса K знак меняется p раз, что соответствует условиям теоремы о разбиении $\mathbb{R}^n$ на непересекающиеся конусы. Отсюда получаем, что конус K и ортант $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$ имеют только одну общую точку.

В силу произвольного выбора поверхности $L_{\tau, \varepsilon}$ мы получаем, что система (10) имеет только нулевое решение. Таким образом доказана и достаточность условия в теореме 1.

В заключение отметим следующий любопытный факт из области линейной алгебры, вытекающий из доказательства Теоремы 1.

Следствие. Пусть $a^{(i)}$ — строки неотрицательной квадратной $n \times n$ -матрицы $A = \|a_{ij}\|_{i,j=1}^n$, определяющие кусочно-линейную функцию

$$g_A(v) = g_A(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i=1}^n \left(|v_i| + |\langle a^{(i)}, v \rangle| - |\langle a^{(i)}, v \rangle - v_i| \right).$$

Все главные миноры матрицы A положительны тогда и только тогда, когда функция $g_A(v)$ положительна для всех $v \neq 0$.

Для доказательства этого утверждения достаточно в теореме 1 в качестве системы (1) рассмотреть систему уравнений вида

$$y_j^{m_j} + x^{(j)} y_1^{a_{1j}} \dots y_n^{a_{nj}} - 1 = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Список литературы

- [1] Mellin H.J., *Résolution de l'équation algébrique générale à l'aide de la fonction gamma*, C.R.Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 1921. V. 172. P. 658–661.
- [2] Антипова И. А. *Обращения многомерных преобразований Меллина и решения алгебраических уравнений*, Матем. сб., 2007. Т. 198, вып. 4. С. 3–20.
- [3] Antipova I.A., Zyкова T.V., *Mellin transforms and algebraic functions*, Integral Transform. Spec. Funct. 2015 V. 26. No.10, P. 753–767.
- [4] Садыков Т.М., *О многомерной системе дифференциальных гипергеометрических уравнений*, Сиб. матем. журн., **39:5** (1998), 1141–1153.
- [5] Дикенштейн А., Садыков Т. М., *Базисы в пространстве решений системы уравнений Меллина*, Матем. сб., 2007. Т. 198, вып. 9. С. 59–80.
- [6] Антипова И. А. *Выражение суперпозиции общих алгебраических функций через гипергеометрические ряды*, Сиб. матем. журн., 2003, Т. 44, вып. 5. С. 972–980.
- [7] Степаненко В.А. *О решении системы n алгебраических уравнений от n неизвестных с помощью гипергеометрических функций*, Вестник КрасГУ, **1** (2003), 35–48.
- [8] Nilsson L., *Amoebas, Discriminants, and Hypergeometric Functions*, Doctoral Thesis, Department of Mathematics, Stockholm University, Sweden, 2009.
- [9] Садыков Т.М., Цих А.К. *Гипергеометрические и алгебраические функции многих переменных*. — М.: Наука, 2014. — 408 с.

- [10] Samelson H., Thrall R.M., Wesler O. *A partition theorem for Euclidean n -space*. Proc. Amer. Math. Soc. 1958. V. 9. P. 805–807.
- [11] Прасолов В.В. *Задачи и теоремы линейной алгебры*. – Новое изд., перераб. — М.: МЦНМО, 2015. — 576 с.
- [12] Антипова И.А., Цих А.К., *Дискриминантное множество системы n полиномов Лорана от n переменных*, Изв. РАН. Сер. матем., **76:5** (2012), 29–56.
- [13] Kulikov V.R. *Conditions for convergence of the Mellin–Barnes integral for solution to system of algebraic equations*, Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ. 2014. Т.7, вып. 3. С. 339–346.
- [14] Жданов О.Н., Цих А.К., *Исследование кратных интегралов Меллина–Барнса с помощью многомерных вычетов*, Сиб. матем. журн. 1998. Т.39, вып. 2. С. 282–298.